

Vážení čtenáři, na stránkách Urologie pro praxi se v každém čísle setkáváte s autodidaktickým testem, který ověří, jak pečlivě jste pročetli publikované články. Test se skládá ze 12 otázek, na každou existuje alespoň jedna správná odpověď, řešení najdete na jeho konci. Přejeme Vám hodně zábavy a především pocit uspokojení z výsledku.

1 U novorozenců je předkožka volně přetahovatelná:

- a) vždy
- b) 30 %
- c) 4 %
- d) nikdy

2 Po kúře steroidy dochází k uvolnění zúžené předkožky:

- a) vždy
- b) u 50 % léčených
- c) až u 80 % léčených
- d) výjimečně

3 Plastická operace dle Buriana:

- a) odstraňuje kompletně předkožku
- b) dorzálně inciduje předkožku
- c) ventrálně inciduje předkožku
- d) odstraňuje jen část zúžené předkožky s ponecháním nezúžené části k zakrytí části glandu

4 Komplikace operačního řešení se objevují s četností:

- a) méně 1 %
- b) 50 %
- c) až 35 %
- d) do 10 %

5 Balanitis xerotika obliterans:

- a) je vhodná na primární léčbu steroidem
- b) je absolutní indikací k chirurgickému léčení – obřízce
- c) vyskytuje se jen u novorozenců
- d) vzniká jen u dospělých

6 Mužská hormonální antikoncepce je založena na podávání:

- a) androgenů
- b) androgenů a gestagenů
- c) GnRH agonistů
- d) GnRH antagonistů

7 Vazektomie má být považována za:

- a) plně reverzibilní
- b) zčásti reverzibilní
- c) ireverzibilní
- d) individuálně reverzibilní

8 Hormonální antikoncepce a zvyšující se potřeba asistované reprodukce u žen:

- a) nesouvisí
- b) částečně souvisí
- c) pravděpodobně souvisí
- d) objevují se ve stejném období

9 Jaký antiandrogen lze v monoterapii použít v primární hormonální léčbě karcinomu prostaty?

- a) nilutamid
- b) bicalutamid
- c) flutamid
- d) cyproteron acetát

10 Po jaké základní léčbě změnilo podání bicalutamidu v programu EPC v dávce 150 mg denně celkové přežití u nemocných s lokálně pokročilým karcinomem?

- a) radikální prostatektomie
- b) radioterapie
- c) watchful waiting a a)
- d) watchful waiting a b)

11 Pro intermitentní androgenní blokádu (IAB) jsou indikovani zejména pacienti

- a) s velkoobjemovým generalizovaným karcinomem
- b) progredující po několika cyklech IAB
- c) s asymptomatickou recidivou karcinomu po předchozí kurativní lokální léčbě
- d) se symptomatickým generalizovaným karcinomem

12 Dávky bisfosfonátů používané v léčbě osteoporózy různé etiologie nebo Pagetovy nemoci jsou ve srovnání s dávkami u kostních změn při maligních onemocněních

- a) mnohem menší
- b) mnohem větší
- c) srovnatelné
- d) nerozlišují se

13 Jaká bývá obvyklá kompliance pacientů k provedení spermioqramu po sterilizaci?

- a) do 30 %
- b) 40–50 %
- c) 60–70 %
- d) 90–100 %

14 Za jaké období je doporučena další kontrola spermioqramu při pozitivním záchytu spermií v ejakulátu?

- a) 1 měsíc
- b) 2 měsíce
- c) 3 měsíce
- d) 4 měsíce

Správné odpovědi: 1. c; 2. c; 3. d; 4. c; 5. b; 6. a, b, c, d; 7. c; 8. c, d; 9. b; 10. d; 11. c; 12. a; 13. b; 14. a