

Primární hyperoxalurie 1. typu (PH1):
metabolické onemocnění s tvorbou kamenů,
které může mít velmi těžké následky^{1,2,4}



**PACIENTI S PRIMÁRNÍ HYPEROXALURIÍ (PH1) MOHOU MÍT JEDEN
NEBO VÍCE Z NÍŽE UVEDENÝCH KLINICKÝCH PROJEVŮ:**



Recidivující urolitiázu¹



**Ledvinové kameny
u dětí⁴**



Nefrokalcinózu^{1,2,3}



**Neprospívání
v raném dětství⁴**



**Progredující pokles renální
funkce neznámé příčiny, který
obvykle vyústí do ESRD*^{1,2,3}**



**Rodinná anamnéza
urolitiázy³**

**Přítomnost ledvinových kamenů je nejčastějším klinickým projevem,
který vede k diagnóze primární hyperoxalurie 1. typu (PH1)⁵**

* ESRD, terminální stádium renálního onemocnění

Určeno pouze pro zdravotnické pracovníky.

Vytvořeno a financováno společností Alnylam Pharmaceuticals.

Reference: 1. Hoppe B. *Nat Rev Nephrol.* 2012;8(8):467–475. 2. Cochat P, Rumsby G. *N Engl J Med.* 2013;369(7):649–658. 3. Cochat P, Hulton SA, Acquaviva C, et al. *Nephrol Dial Transplant.* 2012;27(5):1729–1736. 4. Milliner DS, Harris PC, Cogal AG, Lieske JC. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1283/>. Updated November 30, 2017. Accessed April 14, 2021. 5. Hoppe B, Langman CB. *Pediatr Nephrol.* 2003;18:986–991.

Kod: CZ-ALN-034-08/2025 | Datum přípravy: září 2025

Medison Pharma s. r. o.

Scott.Weber Workspace, Plynární 10/1617, 170 00 Praha 7

e-mail: office.czech@medisonpharma.com

**BEHIND THE
STONE™**